

EL RIEGO

- ◆ Después de acolchar y montar la instalación de goteo y previo a la plantación, daremos un riego para saturar la tierra de 10 / 14 horas.
- ◆ El **INTIA – SAR proporciona pautas de riego semanales** en función del estado fenológico del cultivo que se modula en función del desarrollo y de la climatología de la campaña.

3. Consumo de agua orientativo en m³/ha

| Mes | Riego sat | Transpl | mayo | junio | julio | agosto | Total |
|--------------------|-----------|---------|------|-------|-------|--------|-------|
| m ³ /ha | 330 | 50 | 180 | 1.040 | 1.650 | 180 | 3.430 |

- ◆ Estas cantidades son para una plantación de primeros de mayo en la zona Intermedia de Navarra.

CONTROL DE MALAS HIERBAS

- ◆ Podemos incidir en su control en preplantación antes de acolchar la parcela y en postplantación con los **herbicidas registrados** para el cultivo.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

- ◆ Es muy importante la **detección precoz** y el seguimiento de la **Estación de avisos de INTIA** para tener un control bueno con pocos tratamientos.
- ◆ Las plagas más comunes son malduerme (*Agrostis* sp), pulgón (*Aphis gossypii*), araña amarilla (*Tetranychus urticae*).
- ◆ Las enfermedades foliares más comunes son: botritis (*Botrytis cinérea*), oídio (*Erysiphe cichoracearum* – *Sphaerotheca fulginea*). Es muy importante el control del oídio; para ello, procuraremos ir siempre por delante de él.



Síntomas de oídio.

- ◆ Al inicio de la floración (finales de mayo /primeros de junio), si se dan temperaturas bajas y humedades altas, provocarán mala fecundación, con frutos deformes por falta de polen e insectos polinizadores



A la izquierda, flor femenina de calabacín. A la derecha, mal cuajado por falta de polinización.

RECOLECCIÓN

- ◆ El momento de inicio de la recolección es en función del calibre y longitud del fruto. Para industria será de entre 600/800 gramos y para plaza de 45 mm de diámetro y 25 cm de largo.
- ◆ El fruto se recoge en bañeras y /o en palots en función de cada destino.
- ◆ La recolección es prácticamente diaria para evitar destríos por frutos de tamaño excesivo.



Recolección y frutos de calabacín.