



LA BRUCELA OVIS

(EPIDIDIMITIS CONTAGIOSA
O MAL DEL CARNERO)

Andrés Arriaga
Antonio Puig

Sección de Sanidad Animal
Dpto. de Agricultura, Ganadería y Alimentación

S *E trata de una enfermedad contagiosa bien conocida por los ganaderos, que ataca a los machos de ovino y causa descensos de*

rentabilidad en las explotaciones. Su prevención resulta fácil pero, a menudo, se descuidan las medidas preventivas y esto provoca en ocasiones la aparición de este problema en los rebaños.

Los Servicios de sanidad ganadera del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación han iniciado una campaña informativa sobre algunas de las principales enfermedades infecto-contagiosas que afectan al ganado para reforzar la prevención entre los ganaderos navarros.



do se hallen defectos lo mejor es eliminar al carnero).

Análisis de sangre cada 2-3 meses (**sobre todo al bajar del comunal y también antes de subir**).

Sacrificio inmediato de los carneros positivos al análisis de sangre ó con lesiones del testículo.

REBAÑOS LIBRES

Dos análisis de sangre al año en rebaños donde hace tiempo que no ha habido animales positivos (uno de los análisis justo antes del echar los machos).

Todas las compras de carneros con certificado veterinario y de rebaños libres. El animal recién comprado se mantendrá aislado del resto haciendo una palpación y un análisis de sangre antes de juntarlo con los demás.

El intercambio, cesión, préstamo, etc, de carneros entre explotaciones, supone un grave riesgo sanitario.



BENEFICIOS DE UN REBAÑO LIBRE DE BRUCELA OVIS

1- MAYOR RENDIMIENTO ECONOMICO:

- a- Disminuye el número de abortos.
- b- Aumenta el número de ovejas preñadas.
- c- Aumenta el número de corderos vivos.
- d- Aumenta el número de corderos destetados.

2- MEJOR MANEJO: las pariciones son más agrupadas.

Cómo evitar que sus machos se contagien de Brucela ovis

- 1- **Sanee todos sus mardanos a partir de los 6 meses de edad.**
- 2- *Que los machos sean de casa.*
- 3- *Si tiene que comprar mardanos, que sean de explotaciones calificadas sanitariamente y que estén saneados dentro de los últimos 30 días. Esto se comprueba con el certificado sanitario.*
- 4- *No haga cambios o préstamos, ni mezcle sus mardanos con los de otros ganaderos.*
- 5- *Sacrifique inmediatamente los machos positivos y vuelva a hacer análisis cada 2 ó 3 meses, sobre todo antes de subir y bajar a los comunales.*
- 6- *Haga lotes de machos por edades:*
 - a- *corderos, recríelos con corderas de su edad;*
 - b- *machos de 1 a 2 años;*
 - c- *adultos de más de tres años.*
- 7- *Es recomendable que, periódicamente, su veterinario realice palpaciones de los testículos, a los machos mayores de 6 meses.*
- 8- *Siempre que compre algún macho, NOTIFIQUESELO al veterinario de su zona y muéstrole el certificado sanitario de compra.*